




Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 10 contratti a tempo pieno ed indeterminato di infermiere (area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario) di cui n. 3 contratti riservati ai volontari delle ff.aa., ai sensi dell’articolo 1014 del d.lgs. n. 66/2010 “codice dell’ordinamento militare.

PROVA 01

[Handwritten signatures]

PROVA NON ESISTENTE

DA INGENITO DANIELE

selexi[®]
test your future

A00001

1 **La glicemia è la determinazione del tasso glicemico:**

- A** nel sangue
- B** nel fegato
- C** nelle urine

A00002

2 **Quali azioni mette in atto l'infermiere per ridurre il dolore associato all'iniezione intramuscolare?**

- A** Sceglie la sede ventroglutea, applica la tecnica a Z, inietta il farmaco nel muscolo lentamente e applica una delicata pressione con una garza asciutta per 30 secondi
- B** Sceglie la sede dorsoglutea, applica la tecnica a Z ed esegue la manovra di Lesser prima di iniettare
- C** Sceglie la sede vastolaterale, sostituisce l'ago usato per aspirare il farmaco ed effettua un massaggio dopo l'iniezione

A00003

3 **Tra le seguenti scale, qual è indicata per la valutazione delle lesioni da pressione?**

- A** Norton
- B** VaS
- C** Ramsay

A00004

4 **Per garantire la pervietà delle vie aeree, in caso di soggetto con perdita di coscienza, occorre:**

- A** effettuare la sublussazione della mandibola
- B** sollevare di almeno 10° la fronte del paziente
- C** comprimere la mascella per far aprire la bocca al paziente

A00005

5 **Per effettuare la rianimazione cardiopolmonare è necessario che il soggetto sia:**

- A** in posizione supina
- B** in posizione Trendelenburg
- C** in posizione di decubito laterale

A00006

6 **Indicare quale fra le seguenti manifestazioni cliniche NON è da considerarsi come complicanza cronica del diabete mellito:**

- A** pancreatite
- B** neuropatia
- C** vasculopatia

A00007

7 **Quale delle seguenti affermazioni, relative allo svuotamento della sacca di raccolta delle urine a circuito chiuso, è corretta?**

- A** Si utilizza il rubinetto posto sul fondo della sacca di raccolta delle urine
- B** Può avvenire solo dopo aver tenuto chiuso il catetere vescicale per 2 o 3 ore
- C** La sacca non deve essere mai svuotata ma deve essere sempre sostituita

A00015

15

Quale colore potrebbero assumere le feci in seguito alla somministrazione di ferro?

- A** Piceo
- B** Rosso
- C** Non subiscono variazione di colore rispetto a una condizione fisiologica

A00016

16

Qual è il segno/sintomo principale in un paziente con occlusione intestinale?

- A** Alvo chiuso a feci e gas
- B** Febbre > 39°C
- C** Rettorragia

A00017

17

Che cosa si intende con il termine "pollachiuria"?

- A** Minzione molto frequente
- B** Minzione normale, ma di colore alterato
- C** Minzione poco frequente

A00018

18

Nell'applicazione di un unguento oftalmico, il farmaco deve essere distribuito:

- A** lungo la rima palpebrale inferiore
- B** lungo la rima palpebrale superiore
- C** solo nell'angolo esterno dell'occhio

A00019

19

In quale tipo di pazienti è più importante la cura dei piedi?

- A** Nei pazienti diabetici
- B** Nei pazienti nefropatici
- C** Nei pazienti traumatizzati

A00020

20

Nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da pressione, occorre evitare di:

- A** frizionare e sfregare la cute, specialmente in corrispondenza delle prominenze ossee
- B** valutare insieme al personale infermieristico la necessità di posizionare un materasso antidecubito
- C** mantenere il più possibile la cute pulita e asciutta

A00021

21

Qual è la profondità corretta per le compressioni toraciche durante il BLS-D in un adulto medio?

- A** Circa 5 cm
- B** Circa 20 cm
- C** Circa 2 cm

29

Quale delle seguenti azioni **NON** è indicata se durante l'alimentazione attraverso sondino si manifesta vomito?

- ☐ **A** Rimuovere immediatamente il sondino
- ☐ **B** Aspirare immediatamente dal sondino
- ☐ **C** Valutare la concentrazione, la quantità e la velocità dell'alimento somministrato

30

Durante il ricovero di una persona anziana, in caso di delirio l'infermiere:

- ☐ **A** cercherà di garantire la sicurezza del paziente
- ☐ **B** applicherà immediatamente mezzi di contenzione fisica ad almeno un arto
- ☐ **C** chiamerà gli agenti di pubblica sicurezza

31

Per alleviare il dolore di un assistito, l'infermiere può utilizzare dei rimedi non farmacologici. Quale delle seguenti è una tecnica di sollievo di tipo cognitivo-comportamentale?

- ☐ **A** La distrazione visiva
- ☐ **B** L'agopuntura
- ☐ **C** La stimolazione elettrica transcutanea

32

Nell'assistenza a una persona diabetica, quali segni/sintomi possono fare sospettare all'infermiere un'ipoglicemia grave?

- ☐ **A** Disorientamento, convulsioni, alterazioni dello stato di coscienza
- ☐ **B** Sudorazione, tremore, tachicardia
- ☐ **C** Sudorazione, aumento della temperatura, tachipnea

33

In quali delle seguenti cavità corporee è possibile effettuare la rilevazione della temperatura corporea interna?

- ☐ **A** Orale, rettale, auricolare, vaginale
- ☐ **B** Inguinale e vaginale
- ☐ **C** Ascellare, auricolare, inguinale

34

In quale posizione deve essere collocato il paziente incosciente che respira?

- ☐ **A** Laterale di sicurezza
- ☐ **B** Semiseduta
- ☐ **C** Supina

35

La sindrome da immobilizzazione predispone:

- ☐ **A** a stato settico e a infezioni dell'apparato respiratorio e urinario
- ☐ **B** solo a infezioni dell'apparato respiratorio
- ☐ **C** solo a infezioni dell'apparato urinario

